



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

Ottawa County Health Department

ບອດຈາລີຊັມ

ບອດຈາລີຊັມຄືຫຍັງ?

ບອດຈາລີຊັມຄື ອັມມະພາດກ້າມເນື້ອຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ນອຍນັກນອຍໜາຈະເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງມາຈາກ ພຶດເປື້ອໃນເສັ້ນເອິນ ທີ່ຜະລິດໂດຍ ແບັກແທເຣືຍ ໃດໜຶ່ງ. ບອດຈາລີຊັມມີຢູ່ນຳກັນສາມແບບຄື: ພຶດເປື້ອ ໃນອາຫານ, ບາດແຜອັກເສບ, ເຈັບໃນລຳໄສ (ທາຣິກ).

ການເຈັບປ່ວຍຊະນິດນີ້ ອາດເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ ແລະ ກໍຖືວ່າ ເປັນກໍຣະນີສຸກເສີນ.

ບອດຈາລີຊັມມີຫລາຍປານໃດ?

ສະຫະຣັດອາເມຣິກາລາຍງານວ່າ ມີຄົນປ່ວຍກໍຣະນີ ບອດຈາລີຊັມປະມານ 110 ຄົນ ແຕ່ລະປີ. ຈາກການ ປ່ວຍດັ່ງກ່າວ, ປະມານ 25% ເປີເຊັນ ແມ່ນເກີດ ຈາກການເປື້ອອາຫານ, 72% ເກີດໃນລຳໄສ, ແລະ 3% ເກີດໃນບາດແຜ.

ບອດຈາລີຊັມແຜ່ລາມແນວໃດ?

ບອດຈາລີຊັມອາດແຜ່ລາມໃນວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ພຶດເປື້ອໃນອາຫານ
 - ອາຫານທີ່ບຸດເນົ່າ
 - ອາຫານທີ່ເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງ ອາຫານກະປ່ອງທີ່ເຮັດເອງ
- ບາດແຜອັກເສບ
 - ແບັກແທເຣືຍເກີດໃນບາດແຜ
 - ສັກຢາແບບຜິດຫລັກການ
- ເຈັບໃນລຳໄສ (ທາຣິກ)
 - ກິນອາຫານທີ່ມີເຊື້ອແຜ່ລາມໄປນຳໄສ ແລ້ວກາຍເປັນພຶດເປື້ອ

ບອດຈາລີຊັມກໍສາມາດໃຊ້ເຮັດອາວຸດໄດ້ ຊະນິດ ຂະຫຍາຍແບັກແທເຣືຍ ໂດຍການສົ່ງມັນໄປຕາມ ອາກາດ.

ບອດຈາລີຊັມບໍ່ແມ່ນພະຍາດຊະນິດທີ່ລາມຕິດຕໍ່ກັນ.

ອາການບາງຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ນີ້ຄືອາການທົ່ວໄປຂອງພະຍາດນີ້:

- ຕາລາຍ
- ຕາມົວ
- ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ
- ກິນນ້ຳລາຍຍາກ
- ປາກແຫ້ງ
- ກາມເນື້ອອອນເພັຍ ຫລື ເຫນັງຕິງບໍ່ໄດ້

ພຶດເປື້ອໃນອາຫານ: ອາການທຳອິດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 18 ຫາ 36 ຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄວກວ່ານັ້ນພາຍໃນ 6 ຊົ່ວ ໂມງ ຫລືເກີດຊ່າສຸດພາຍໃນ 14 ມື້.

ເຈັບໃນລຳໄສ (ທາຣິກ): ເດັກທາຣິກອາດເບິ່ງຄືເມື່ອຍ, ບໍ່ຢາກກິນ, ຖ່າຍຍາກ, ໄຫແບບບໍ່ມີກຳລັງ ແລະອອນເພັຍ.

ຈະກວດພົບບອດຈາລີຊັມໄດ້ແນວໃດ?

ຈະກວດພົບບອດຈາລີຊັມໄດ້ຈາກເລືອດ ຫລືອາຈົມ (ຂີ້ ຂອງຄົນເຈັບ, ແລະໂດຍການກວດອາຫານທີ່ໄດ້ກິນ.

ຈະຮັກສາບອດຈາລີຊັມໃນວິທີໃດ?

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການເຈັບປ່ວຍ ທ່ານໝໍຈະປິ່ນປົວ ພະຍາດນີ້ດ້ວຍຢາ ແອນທາຍທອກຊິນ, ຊຶ່ງມັນຈະ ກຳຈັດພຶດເປື້ອໃນເລືອດ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄົນປ່ວຍບາງຄົນອາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ຫລາຍອາທິດ, ພ້ອມດ້ວຍຮັບການ ຮັກສາ ແລະດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກໝໍພ້ອມແພດ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບອດຈາລີຊັມ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org

Center for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/botulism/
ເລກໂທຣະສັບ: (888) 246-2675