



# សន្លឹកព័ត៌មានសាធារណៈ

Ottawa County Health Department

## កាំពិឡូបាក់ទ័រ [CAMPYLOBACTER]

### តើ មេរោគ កាំពិឡូបាក់ទ័រ ជាអ្វី?

កាំពិឡូបាក់ទ័រ គឺជាបាក់តេរីមួយដែលអាចធ្វើឱ្យមាន រោគសញ្ញាទាក់ទងនឹងពោះ ។

### តើកាំពិឡូបាក់ទ័រឆ្លងតាមរបៀបអ្វីខ្លះ?

មេរោគកាំពិឡូបាក់ទ័រអាចឆ្លងតាមរបៀបខាងក្រោម៖

- ការបរិភោគ ឬប៉ះពាល់សាច់មាន់ ឬសត្វស្លាប ផ្សេង ដំឡើង ឬស្ទើរឆ្អិន ។
- ការបរិភោគផ្លែឈើ បន្លែស្រស់ ឬទឹកដោះគោ ឆៅ ដ៏មានមេរោគ ។
- ជួនកាលវាអាចឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ មនុស្ស ឬសត្វ ដែលមានមេរោគនេះ ។

### តើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ធម្មតា រោគសញ្ញាចាប់ផ្តើម 2-5 ថ្ងៃក្រោយពីការឆ្លង មានអស់រយៈពេលប្រហែលមួយអាទិត្យ ហើយអាច មានរួមទាំង៖

- ចង់ក្អួត
- ក្អួត
- រាគអាចម៍ (អាចមានឈាម)
- ចុករមួលពោះ
- ឈឺក្រពះ
- ក្តៅខ្លួន

### តើកាំពិឡូបាក់ទ័រត្រូវបានវិនិច្ឆ័យរោគយ៉ាងដូចម្តេច?

ដោយការពិសោធក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ (លាមក) ។

### តើវាត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

មនុស្សភាគច្រើនជា ដោយមិនបាច់ព្យាបាលទេ ។ ក្នុង ករណីរោគអាចម៍ធ្ងន់ វេជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាឱ្យផឹកថ្នាំអង់ទី ប៊ីយ៉ូទិក ។ ការផឹកទឹកច្រើន រួមទាំងទឹកអ៊ីឡិកត្រូឡែត ដូចជា ក្រេតូរ៉េដ [Gatorade] អាចជួយបង្ការកង្វះជាតិ ទឹកក្នុងខ្លួនបាន ។

### តើខ្ញុំអាចបង្ការការឆ្លង កាំពិឡូបាក់ទ័រ បានយ៉ាងដូចម្តេច?

- ចំអិនសាច់សត្វស្លាបទាំងអស់ (ដូចជាសាច់មាន់ និងសាច់មាន់បារាំង) ឱ្យបានឆ្អិនទាំងស្រុង ។
- កុំបរិភោគសាច់សត្វស្លាបដ៏ស្ទើរឆ្អិន ។
- លាងដៃដោយសាប៊ូ មុន នឹងក្រោយពីប៉ះពាល់ សាច់ឆៅ ។
- ចៀសវាងទឹកដោះគោឆៅ និងទឹកមិនបរិសុទ្ធ ។
- បញ្ជាក់ថា អ្នកដែលមានជម្ងឺរាគអាចម៍ ជាពិសេស កូនក្មេង លាងដៃឱ្យបានប្រយ័ត្ន ដោយសាប៊ូ និង ទឹក ។
- លាងដៃដោយសាប៊ូ និងទឹក ក្រោយពីប៉ះពាល់ អាចម៍សត្វ ។

### សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការឆ្លងមេរោគ

### កាំពិឡូបាក់ទ័រ៖

Ottawa County Health Department  
[www.miOttawa.org](http://www.miOttawa.org)  
Medline Plus/National Institutes of Health  
[www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000224.htm](http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000224.htm)