



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

Ottawa County Health Department

ແຄມພິໂລແບັກເທີ [CAMPYLOBACTER]

ແຄມພິໂລແບັກເທີຄືຫຍັງ?

ແຄມພິໂລແບັກເທີເປັນແບັກແທລອຍເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີອາການທາງລຳໄສ້

ແຄມພິໂລແບັກເທີແຜ່ລາມແນວໃດ?

ພະຍາດຕິດຕໍ່ແຄມພິໂລແບັກເທີອາດຈະແຜ່ລາມໄດ້ໂດຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ການກິນ ຫລື ຈັບຕ້ອງໄກ່, ໄກ່ງ່ວງ, ຫລື ເປັດທີ່ດິບ ຫລື ເຮັດບໍ່ສຸກ.
- ການກິນໝາກໄມ້ ຫລື ຜັກທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້ເຈືອປົນຢູ່ນຳ ຫລື ການດື່ມນົມທີ່ບໍ່ຫັນໄດ້ອ້າເຊື້ອໂຮກເທື່ອ.
- ບາງຄັ້ງແຜ່ລາມໂດຍກົງນຳຄົນ ຫລື ສັດທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້.

ອາການບາງຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ຕາມທຳມະດາອາການຈະເລີ່ມຂຶ້ນ 2 ຫາ 5 ມື້ຫລັງຈາກຕິດແທດ, ຈະເປັນປະມານອາທິດໜຶ່ງ ແລະ ອາດຈະມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ບຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ
- ຮາກ
- ລົງທ້ອງ (ອາດຈະມີເລືອດ)
- ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ
- ປວດທ້ອງ
- ສິ່ງຮ້ອນ

ຈະກວດພົບແຄມພິໂລແບັກເທີໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍການກວດໃນທ້ອງວີໄຈ (ກວດອາຈົມ).

ວິທີຮັກສາມີຫຍັງແດ່?

ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະດີຂຶ້ນປາດສະຈາກການຮັກສາ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີອາການລົງທ້ອງຢ່າງໜັກ, ທ່ານໝໍອາດຈະສັ່ງໃຫ້ກິນຢາຕ້ານທານ. ໃຫ້ດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ, ຮ່ວມດ້ວຍນ້ຳ ເອເລກໂທຣໂລດ ດັ່ງເຊັ່ນ ເກໂທແອດ, ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາດນ້ຳໃນຮ່າງກາຍໄດ້.

ຈະປ້ອງກັນຈາກແຄມພິໂລແບັກເທີດ້ວຍວິທີໃດ?

- ເຮັດອາຫານທີ່ເປັນໄກ່ ແລະ ໄກ່ງ່ວງໃຫ້ສຸກດີ.
- ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນໄກ່ ຫລື ໄກ່ງ່ວງທີ່ບໍ່ສຸກ.
- ລ້າງມືດ້ວຍສະບູກ່ອນ ແລະ ຫລັງຈາກຈັບຊັ້ນດິບ.
- ຫລີກລ້ຽງຈາກນ້ຳນົມທີ່ບໍ່ຫັນໄດ້ອ້າເຊື້ອໂຮກ ຫລື ນ້ຳທີ່ບໍ່ສະອາດ.
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນທີ່ລົງທ້ອງ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ, ລ້າງມືຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳ.
- ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳຫລັງຈາກຈັບອາຈົມຂອງສັດລ້ຽງ (ຂີ້ຂອງສັດລ້ຽງ).

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ພະຍາດຕິດຕໍ່ແຄມພິໂລແບັກເທີ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org
Medline Plus/National Institutes for Health
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000224.htm