



សន្លឹកព័ត៌មានសាធារណៈ

Ottawa County Health Department

គ្រុន Q [Q FEVER]

តើគ្រុន Q គឺជាអ្វី?

គ្រុន Q គឺជាជំងឺឆ្លងមួយ ដែលឆ្លងពីសត្វ ទៅមនុស្ស ។ វាបង្ក ដោយបាក់តេរីមួយរស់នៅក្នុងសត្វគោ ច្រើន ពពែ ហើយត្រូវបាន រកឃើញ ក្នុងសត្វពាហនៈមួយចំនួនទៀត ។

សត្វមានមេរោគនេះ មិនមែនឈឺគ្រប់គ្នាទេ ។ ប៉ុន្តែពួកវាបញ្ចេញ បាក់តេរីនៅក្នុងទឹកដោះ ទឹកនោម លាមក និងទឹកស្អុយរបស់វា ។ គ្រុន Q អាចទប់ទល់នឹងកំដៅ ការហាលឱ្យស្ងួត ហើយនិងវិធី សម្លាប់មេរោគសាមញ្ញជាច្រើនទៀត ។

តើគ្រុន Q សម្បូរប៉ុណ្ណា?

មនុស្សស្រួលឆ្លងគ្រុន Q ណាស់ ពីព្រោះវាសម្បូរណាស់ ក៏ប៉ុន្តែវា កម្រត្រូវគេរាយការណ៍ ដោយសារក្នុងករណីជាច្រើន ជំងឺស្រាល ពេក ។

តើគ្រុន Q ត្រូវបានឆ្លងយ៉ាងដូចម្តេច?

- គ្រុន Q អាចឆ្លងបាន តាមរបៀបទាំងឡាយខាងក្រោម នេះ:
- ដកដង្ហើមចូល នូវបាក់តេរីពីធូលីហុយនៅកសិដ្ឋាន ដែល មានធាតុសល់ពីកំណើតកូនសត្វ
- ខ្យល់អាចបក់ធូលីនេះ អស់ចំងាយកន្លាស់ម៉ែល ឬឆ្ងាយ ជាង
- ផឹកទឹកដោះ ដែលមានមេរោគ
- កូត និងដកដង្ហើមចូល នូវអាហារដែលមានមេរោគក្នុងវា (កម្រជាង)

ការឆ្លងពីមនុស្ស ទៅមនុស្ស នៃមេរោគប្រូសេឡូស៊ីស កម្រមាន មែនទែន ។

តើមានមេរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

មនុស្សអាចកើតគ្រុន Q ដោយមិនដឹងខ្លួន ឬមួយគេអាចស្មាន ច្រឡំថា កើតគ្រុនធម្មតា ។ អ្នកខ្លះកើតមេរោគសញ្ញាភ្លាម ។ រយៈពេល សម្រាប់បាក់តេរីគ្រុន Q គឺពី 14 ថ្ងៃ ទៅ 21 ថ្ងៃ ។

រោគសញ្ញាទូទៅអាចមានរួមទាំង:

- ក្តៅខ្លួនខ្លាំង
- រងា និងបែកញើស
- ឈឺក្បាល និងសាច់ដុំ
- ឈឺបំពង់ក
- លែងចង់បរិភោគអាហារ
- ក្អក
- កូត និងអារម្មណ៍ចង់កូត
- រាគអាចម៍
- ឈឺពោះ
- ឈឺដើមទ្រូង

អ្នកខ្លះអាចកើតរោគហើមស្ងួត ឬរោគឆ្អើម ។ អ្នកភាគច្រើននឹងមាន ដំណើរឆ្អើមដ៏ខុសប្រក្រតី ។

តើគ្រុន Q ត្រូវបានវិនិច្ឆ័យរោគយ៉ាងដូចម្តេច?

គ្រុន Q ត្រូវបានពិនិត្យឃើញ ដោយពិនិត្យឈាម ។

តើគ្រុន Q ត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

ជារឿយៗ ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលគ្រុន Q ហើយ មនុស្សភាគច្រើនជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់ ។ ធម្មតា អ្នកដែលមិនស្វែង រកការព្យាបាល នោះនឹងជាក្នុងរយៈពេលបួនដប់ខែ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគ្រុន Q ទាក់ទង:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org

Center for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/Qfever/

ទូរស័ព្ទ: (888) 246-2675