



សន្លឹកព័ត៌មានសាធារណៈ

Ottawa County Health Department

គ្រីតតូស្តេរីយ៉ូស៊ីស [CRYPTOSPORIDIUM]

តើ គ្រីតតូស្តេរីយ៉ូស៊ីស គឺជាអ្វី?

គ្រីតតូស្តេរីយ៉ូស៊ីស គឺជាជំងឺពោះវៀនមួយ បង្កឡើងដោយមេរោគតូចក្រៃលែងមួយ ដែលអាចឆ្លងក្នុងលាមករបស់មនុស្ស ឬសត្វ ដែលមានមេរោគនេះ។ ទាំងជំងឺ និងមេរោគ ហៅកាត់ថា "គ្រីតតូ" ។ មេរោគនេះការពារដោយសំបកខាងក្រៅ ដែលជួយវារស់នៅខាងក្រៅរូបកាយអស់រយៈពេលដ៏យូរ ហើយជួយវាឱ្យទប់ទល់នឹងការសម្លាប់មេរោគដោយធាតុគីមី។

តើមេរោគគ្រីតតូ ត្រូវឆ្លងតាមរបៀបអ្វីខ្លះ?

គ្រីតតូអាចឆ្លងបានតាមរបៀបខាងក្រោមនេះ៖
លេបចូលរបស់ណា ដែលបានប៉ះនឹងលាមករបស់មនុស្ស ឬសត្វ ដែលមានមេរោគគ្រីតតូ

- លេបចូលទឹក ដែលមានមេរោគគ្រីតតូ ពីអាងហែលទឹក អាងមុជទឹកក្តៅ បឹង ទន្លេ ជ្រាប
- ស្រះ ឬអូរ ដែលពុលលាមក
- បរិភោគអាហារស្ទើរឆ្អិន ដែលពុលមេរោគគ្រីតតូ

តើជំងឺនេះអាចមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ធម្មតា រោគសញ្ញានៃគ្រីតតូចាប់ផ្តើម 2-10 ថ្ងៃក្រោយពីការឆ្លង ហើយជំងឺមានអស់រយៈពេល 2 អាទិត្យ ។ ជាញឹកញយ រោគសញ្ញាចុះឡើងៗ គឺជួនពេលអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍គ្រាន់ រួចហើយលាប់វិញម្តងទៀត រាល់ពីបីអាទិត្យម្តង រហូតដល់អស់ជំងឺ។ ធម្មតា មេរោគនៅតែមាននៅក្នុងលាមកអស់រយៈពេលពីខែក្រោយមក ទៀត ហើយក្នុងពេលនេះ វាអាចឆ្លងទៅអ្នកដទៃបាន។

រោគសញ្ញាអាចមានរួមទាំង៖

- ក្រពះមិនស្រួល
- រមួលចុកក្រពះ
- រាគអាចម៍
- ក្តៅខ្លួនតិចៗ

អ្នកខ្លះមិនមានរោគសញ្ញាសោះ ។ ឯអ្នកខ្លះទៀតដែលមានប្រព័ន្ធស៊ាំជំងឺខ្សោយ មានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺដ៏ធ្ងន់ជាង។

ឧទាហរណ៍នៃអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធស៊ាំខ្សោយ គឺមានរួមទាំង៖
អ្នកជំងឺ HIV/AIDS អ្នកជំងឺមហារីក អ្នកទទួលសរីរាង្គពីអ្នកដទៃ ហើយនិងអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដទៃទៀត។

តើជំងឺគ្រីតតូត្រូវបានវិនិច្ឆ័យរោគយ៉ាងដូចម្តេច?

ជំងឺគ្រីតតូត្រូវបានវិនិច្ឆ័យរោគ ដោយពិនិត្យលាមក។ ប្រហែលជាត្រូវការពិនិត្យលាមកបួន ឬដប់ដង ក្នុងរយៈពេលបួន ឬដប់ថ្ងៃ។

តើជំងឺគ្រីតតូ ត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

គ្មានការថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកជាក់លាក់ណា សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រីតតូទេ។ មនុស្សភាគច្រើនដែលមានប្រព័ន្ធស៊ាំជំងឺរឹងមាំ នោះនឹងជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯង។ អ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយ គឺមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាង ហើយអាចត្រូវការដេកមន្ទីរពេទ្យក៏បានដែរ។ ថ្នាំប្រឆាំងជំងឺរាគ អាចប្រើប្រាស់ម្តងមួយពេលក៏បាន ប៉ុន្តែត្រូវពិគ្រោះជាមួយនិងពេទ្យមុនដំបូងសិន។

តើអាចបង្ការជំងឺគ្រីតតូបាន យ៉ាងដូចម្តេច?

- លាងដៃដោយសាប៊ូ និងទឹក ក្រោយពីបទដឹង ដូរកន្ទុប ក្មេង ហើយនិងមុនអ្នករៀបចំម្ហូប និងភេសជ្ជៈ
- ចៀសវាងទឹក និងអាហារ ដែលអាចមានមេរោគ
- ចៀសវាងកុំឱ្យទឹកពីបឹង ទន្លេ ជ្រាប ស្រះ ឬអូរ លើកលែងតែទឹកនេះត្រូវបានសម្អាតដោយជាតិក្លរីន
- ដាំទឹកដែលមិនបានសម្អាតឱ្យបានពុះ អស់រយៈពេលមួយនាទី ដើម្បីសម្លាប់មេរោគគ្រីតតូស្តេរីយ៉ូស៊ីស
- ចៀសវាងកុំឱ្យហែលទឹកអស់រយៈពេលពីរអាទិត្យក្រោយពីអ្នកឈប់ភាគអាចម៍ បើអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រីតតូ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជំងឺគ្រីតតូស្តេរីយ៉ូស៊ីស ទាក់ទង៖

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org
Center for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/ncidod/dpd/list_crp.tm
ទូរស័ព្ទ: (888) 342-2437