



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

Ottawa County Health Department

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຄືຫຍັງ?

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຄືໂຮກຊະນິດນຶ່ງ ເກີດຈາກເຊື້ອໂຮກທີ່ເອົາໄປໃນຮູດັງ, ຄໍ ແລະ ປອດ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຮູ້ເຖິງ ແລະຈະມາພາດເຖິງ ນຶ່ງອາທິດຫລືດົນກວ່ານັ້ນ.

ແມ່ນໃຜທີ່ສາມາດຕິດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່?

ທຸກຄົນສາມາດຕິດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄດ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄົນແກ່ຊະຣາ, ທຸກຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາ, ແລະເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ຈະຕິດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄວກວ່າໝູ່.

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແຜ່ລາມແນວໃດ?

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຈະແຜ່ລາມຈາກຄົນນຶ່ງຫາອີກຄົນນຶ່ງ ໂດຍການໄອ ແລະຈາມ.

ອາການບາງຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອາການໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 3 ມື້ ຫລັງຈາກການຕິດຕໍ່:

- ເປັນໄຂ້ (ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຮ້ອນຫລາຍ)
- ເມື່ອຍ
- ປວດຫົວ
- ປວດຕາມກ້າມເນື້ອ
- ໄອແຫງ
- ນ້ຳມູກໄຫລ
- ໜາວເຍືອກ
- ເຈັບຄໍ

ຈະກວດພົບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄດ້ແນວໃດ?

ມັນຍາກທີ່ຈະຮູ້ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ອີງຕາມອາການຂອງທ່ານ. ທ່ານໝໍສາມາດກວດ

ເບິ່ງວ່າ ທ່ານເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຫລືບໍ່ ຖ້າທ່ານໄປຫາໝໍພາຍໃນສອງສາມມື້ ຫລັງຈາກຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.

ຈະຮັກສາໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ດ້ວຍວິທີໃດ?

ວິທີຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການຢູ່ເຮືອນ, ພັກຜ່ອນ ແລະກິນນ້ຳຫລາຍໆ. ຢ່າແກ້ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທີ່ຂາຍຕາມຕາລາດ ກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້, ແຕ່ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາພາຍໝໍທ່ານ, ໂດຍສະເພາະກ່ອນເອົາຢາໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນ.

ຈະຫລີກເວັ້ນຈາກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ດ້ວຍວິທີໃດ?

- ເອົາມືປິດປາກເມື່ອໄອ ຫລືຈາມ
- ຫລີກລຽງຈາກຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
- ລ້າງມືເລື້ອຍໆ
- ສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ແມ່ນໃຜຄວນໄປສັກຢາກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່?

- ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກນ້ອຍ ທີ່ເຈັບປ່ວຍເລື້ອຍໆ
- ຜູ້ຕິດແທດກັບຄົນທີ່ຕິດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໄວ ຫລືຄົນທີ່ປ່ວຍໂຊ
- ຜູ້ມີອາຍຸ 50 ປີ ຫລືສູງກວ່ານັ້ນ
- ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ຫາ 23 ເດືອນ
- ຜູ້ຕິດແທດກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ຫາ 23 ເດືອນ
- ຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາໄດ້ສາມສີ່ເດືອນ ຫລື ຫົກເຈັດເດືອນ ໃນຊ່ວງຜູ້ຄົນເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
- ພະນັກງານແພດ

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 65 ປີ ຫລືຜູ້ມີບັນຫາເຮື້ອງ ສຸຂພາບ ຄວນສັກຢາ pneumococcal vaccine ນຳອີກ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org

Center for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/flu/
ເລກໂທລະສັບ: (888) 246-2675