



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

Ottawa County Health Department

ໂຮກໝາກເປີດ [MUMPS]

ໂຮກໝາກເປີດຄືຫຍັງ?

ໂຮກໝາກເປີດເປັນໂຮກທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເກີດຈາກວາຍຣັສ.

ໂຮກໝາກເປີດແຜ່ລາມແນວໃດ?

ໂຮກໝາກເປີດອາດຈະແຜ່ລາມດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ນ້ຳອື່ນູກຈາກດັງ ແລະ ຮູຄໍຂອງຄົນທີ່ມີໂຮກໝາກເປີດ.
- ແຕະຕ້ອງສິ່ງຂອງທີ່ມີນ້ຳອື່ນູກຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຮກນີ້ຕິດຢູ່ນຳ.

ອາການບາງຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ອາການອາດຈະຮ່ວມດ້ວຍ:

- ຕ່ອມນ້ຳລາຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໜ້າ ແລະ ກ້ອງທູຈະໄຄ່ ແລະ ເຈັບ
- ຄິງຮ້ອນ ແລະ ໝາວເຍືອກ
- ປວດຫົວ
- ສຳລັບຜູ້ຊາຍໄຂ່ທຳຂ້າງໜຶ່ງ ຫລື ຫົງສອງຂ້າງຈະໄຄ່ ແລະ ເຈັບ.

ຈະກວດພົບໂຮກໝາກເປີດໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍການກວດຮ່າງກາຍ ແລະ ກວດເລືອດ.

ຈະຮັກສາໂຮກໝາກເປີດໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?

- ບໍ່ມີວິທີຮັກສາສຳລັບໂຮກໝາກເປີດ. ຫລັງຈາກຕ່ອມນ້ຳລາຍໄຄ່ຂຶ້ນແລ້ວຄົນທີ່ເປັນໂຮກໝາກເປີດຕ້ອງບໍ່ໄປເຮັດວຽກ ຫລື ໄປໂຮງຮຽນ 9 ມື້.
- ກິນ ໂທເລນອລ (Tylenol) ສຳລັບຄິງຮ້ອນ ແລະ ເຈັບ. ການກິນອາຫານອ່ອນໆສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ເຈັບປວດໜ້ອຍລົງໄດ້ຄືກັນ.

ຈະປ້ອງກັນຈາກໂຮກໝາກເປີດດ້ວຍວິທີໃດ?

ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ຫາ 15 ເດືອນຕ້ອງສັກຢາປ້ອງກັນໂຮກໝາກເປີດ ແລະ ສັກຢານີ້ອີກເມື່ອອາຍຸໄດ້ 4 ຫາ 5 ປີເພື່ອເປັນພາກສ່ວນຂອງການສັກຢາ MMR . ສັກຢາສອງເທື່ອເປັນຜົນດີ 90% ເພື່ອປ້ອງກັນໂຮກນີ້. ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເກີດກ່ອນປີ 1957 ຖືວ່າມີຄວາມຄຸ້ມກັນຕໍ່ພະຍາດໄດ້.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຮກໝາກເປີດ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org
 Center for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/nip/diseases/mumps/default.htm
 ລກໂທອະສັບ: (888) 246-2675