



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

Ottawa County Health Department

ເຜີທູສິສ (ພະຍາດໄອໄກ່) [PERTUSSIS/WHOOPING COUGH]

ພະຍາດໄອໄກ່ຄືຫຍັງ?

ພະຍາດໄອໄກ່ເປັນເຊື້ອໂຣກແບັກແທເລຍໃນທ່າຍໃຈ. ມັນມີຊື່ໜຶ່ງອີກວ່າ ເຜີທູສິສ.

ພະຍາດໄອໄກ່ແຜ່ລາມແນວໃດ?

ພະຍາດໄອໄກ່ອາດຈະແຜ່ລາມດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຫາຍໃຈເອົາຝ່ອຍນ້ຳຂຶ້ນມາຈາກດັງ ຫລື ຮູຄໍຂອງຄົນທີ່ມີພະຍາດໄອໄກ່.
- ແຕະຕ້ອງສິ່ງຂອງທີ່ມີນ້ຳຂຶ້ນມາຈັບຢູ່.

ອາການບາງຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ອາການອາດຈະຮ່ວມດ້ວຍ:

- ຈາມ
- ຂຶ້ນກຸຍ້ອຍ
- ໄຂ້ຕໍ່າ
- ໄອເຊິ່ງຕໍ່ມາຈະໄອຫລາຍກວ່າເກົ່າສາມາດໄອນານເຖິງ 12 ເດືອນ ຫລື ນານກວ່ານັ້ນ. ອາການຂອງການໄອເປັນສຽງຂັ້ນສູງ. ໝາຍເຫດ: ແອນໂອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ, ເດັກນ້ອຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຕອນໄອຈະບໍ່ມີສຽງຂັ້ນສູງ.

ຈະກວດພົບພະຍາດໄອໄກ່ໄດ້ແນວໃດ?

ໂດຍການກວດ ແລະ ກວດເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ເອົາມາຈາກຮູຄໍ.

ການຮັກສາພະຍາດໄອໄກ່ຄືຫຍັງ?

- ໃຫ້ກິນຢາອ້າເຊື້ອໂຣກ. ຜູ້ຄົນຄວນຈະຢູ່ບ້ານຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາ 5 ມື້.
- ແອນໂອຍອາຍຸ 2 ເດືອນ ຫລື ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນຕ້ອງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.
- ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ຫລື ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນຕ້ອງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.
- ລ້າງມືຂອງທ່ານຫລັງຈາກສັ່ງຂຶ້ນມູກ, ໄອ ຫລື ແຕະຕ້ອງສິ່ງທີ່ຕິດອາຈົມ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ພະຍາດໄອໄກ່ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org
 Center for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/pertussis_t.htm
 ເລກໂທລະສັບ: (888) 246-2675