



# HOJA INFORMATIVA PARA EL PÚBLICO

## LA TOS FERINA [PERTUSSIS/WHOOPIING COUGH]

### ¿Qué es la tos ferina?

La tos ferina es una infección bacteriana del tracto respiratorio.

### ¿Cómo se propaga?

La tos ferina se puede propagar de las siguientes maneras:

- Gotitas que se encuentran en el aire y que salen de la nariz y la garganta de personas que tienen tos ferina.
- Contacto con artículos que tienen esas gotitas.

### ¿Cuáles son los posibles síntomas?

Entre los síntomas se pueden citar:

- Estornudos
- Mucosidad nasal
- Fiebre baja
- Una tos que empeora lentamente y que puede durar 1 ó 2 meses o incluso más. Al final de la tos se nota un resuello de tono alto. Nota: los bebés menores de seis meses, los niños mayores y los adultos a menudo no presentan el resuello.

### ¿Cómo se diagnostica?

Por medio de un examen y de una muestra tomada de la garganta.

### ¿Cuál es el tratamiento?

- Antibióticos. La gente debe permanecer en la casa hasta que haya recibido al menos 5 días de tratamiento.
- Una serie de vacunas administradas a los niños a partir de los 2 meses de edad.
- Se recomienda una dosis de refuerzo para personas de 10 años de edad en adelante.
- Lavarse las manos después de sonarse la nariz, toser o tocar artículos sucios.

### Si desea más información sobre la tos ferina, puede ponerse en contacto con:

Ottawa County Health Department

[www.miOttawa.org](http://www.miOttawa.org)

Center for Disease Control and Prevention

[www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/pertussis\\_t.htm](http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/pertussis_t.htm)

Teléfono: (888) 246-2675