



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

ໄຂ້ Q (Q FEVER)

ໄຂ້ Q ຄືຫຍັງ?

ໄຂ້ Q ເປັນເຊື້ອໂຮກທີ່ແຜ່ລາມຈາກສັດຫາຄົນ. ມັນເກີດຈາກແບັກແທເລັຍເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍຈະອາໄສຢູ່ໃນງົວຄວາຍ, ແກະແລະ ແບ້, ແລະ ຢູ່ໃນສັດປະເພດອື່ນໆ ແລະ ໃນສັດບ້ານ.

ສັດທີ່ມີເຊື້ອໂຮກນີ້ອາດຈະບໍ່ເຈັບປ່ວຍ. ແຕ່ຖ້າຍທອດແບັກແທເລັຍຜ່ານນ້ຳນົມ, ນ້ຳຢ່ຽວ, ອາຈົມ, ແລະ ນ້ຳຄ້ຳ. ໄຂ້ Q ຫົນຫານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ບ່ອນທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອໂຮກຫລາຍຢ່າງ.

ໄຂ້ Q ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍປານໃດ?

ຄົນສ່ວນຫລາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄວ້ຈາກ ໄຂ້ Q ເພາະວ່າເຊື້ອໂຮກນີ້ມັນເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ແຕ່ມັນບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເລື້ອຍປານໃດເພາະຫລາຍໆກໍລະນີເຊື້ອໂຮກນີ້ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ໄຂ້ Q ແຜ່ລາມແນວໃດ?

ໄຂ້ Q ອາດຈະແຜ່ລາມຕາມວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຫາຍໃຈເອົາແບັກແທເລັຍຈາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ມາຈາກບ່ອນໄວ້ເຜືອງທີ່ມີເຊື້ອໂຮກ
 - ລົມອາດຈະພັດມາເຄິ່ງໄມ ຫລື ຫລາຍກວ່ານັ້ນ
- ດື່ມນ້ຳນົມທີ່ມີເຊື້ອໂຮກ
- ຮາກ ແລະ ຫາຍໃຈເອົາອາຫານທີ່ມີເຊື້ອໂຮກ (ກໍລະນີນີ້ບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍປານໃດ)

ການຕິດຕໍ່ເຊື້ອໂຮກ ໄຂ້ Q ຈາກຄົນໜຶ່ງຫາອີກຄົນໜຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ອາການບາງຢ່າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນມີຫຍັງແດ່?

ຄົນທີ່ມີ ໄຂ້ Q ບາງຄັ້ງອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ຫລື ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່. ບາງຄົນມີອາການເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວ.

ລະຍະການຝັກໄຂ່ຂອງເຊື້ອໂຮກແບັກແທເລັຍຂອງ ໄຂ້ Q ມີລະຫວ່າງ 14 ຫາ 21 ມື້. ອາການທົ່ວໆໄປອາດຈະມີ:

- ໄຂ້ຂັ້ນສູງ
- ໜາວເຍືອກ ແລະ ເຕືອອອກ
- ເຈັບຫົວ ແລະ ເຈັບກ້າມເນື້ອ
- ເຈັບຄໍ
- ບໍ່ຫິວເຂົ້າ
- ໄອ
- ບຸ້ນຫ້ອງປວດຮາກ ແລະ ຮາກ
- ລົງທ້ອງ
- ເຈັບຫ້ອງ
- ເຈັບເອິກ

ບາງຄົນອາດຈະເປັນໂຮກປອດໄຄ່ ຫລື ໂຮກຕັບອັກເສນ. ຄົນສ່ວນຫລາຍຕັບຈະບໍ່ທຳງານເປັນປົກກະຕິ.

ຈະກວດພົບ ໄຂ້ Q ໄດ້ແນວໃດ?

ໄຂ້ Q ຈະສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍການກວດເລືອດ.

ຈະຮັກສາ ໄຂ້ Q ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຈະໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອໂຮກຮັກສາ ໄຂ້ Q ແລະ ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະເຊົາໄວ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮັກສາຈະເຊົາພາຍໃນຫົກເຈັດເດືອນ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໄຂ້ Q ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org

Center for Disease Control and Prevention
www.bt.cdc.gov/agent/Ofever/
ເລກໂທຣະສັບ: (888) 246-2675