



# ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

## ຊິງແກໂລສິສ (SHINGELLOSIS)

### ຊິງແກໂລສິສ ຄືຫຍັງ?

ຊິງແກໂລສິສ ເປັນເຊື້ອໂຣກຢູ່ລຳໄສ້ເກີດຈາກແບັກແທເລັຍ ເອີ້ນວ່າ “ຊິງແກລາ” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນລົງທ້ອງ, ປວດທ້ອງ ແລະ ຄີງຮ້ອນ. ບາງຄົນທີ່ຕິດແທດເຊື້ອໂຣກນີ້ອາດຈະບໍ່ມີອາການໃດ ທັງໝົດ, ແຕ່ເຊື້ອໂຣກນີ້ອາດຈະຕິດຄືນອີ່ມໄດ້.

### ຊິງແກໂລສິສ ແຜ່ລາມແນວໃດ?

ຊິງແກລາ ອາດຈະແຜ່ລາມດ້ວຍວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໂດຍແບັກແທເລັຍຈາກນິ້ວມືຂອງຄົນໜຶ່ງທີ່ມີເຊື້ອໂຣກ ຫລື ເບີເປື້ອນ ແລ້ວ ເຂົ້າປາກຂອງອີກຄົນໜຶ່ງ:

- ໂດຍການລ້າງມືບໍ່ສະອາດຕິຫລັງຈາກປ່ຽນຜ້າອ້ອມຂອງ ຫາຣົກທີ່ມີເຊື້ອໂຣກ
- ໂດຍຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂຣກລ້າງມືຢ່າງບໍ່ສະອາດຕິຫລັງຈາກຖ່າຍ ແລ້ວ

ໂດຍການກິນອາຫານທີ່ມີເຊື້ອໂຣກປົນຢູ່ນຳ:

- ຊີ້ນດິບ ແລະ ເຮັດບໍ່ສຸກດີ
- ບໍ່ລ້າງຜັກທີ່ມາຈາກສວນປູກຜັກທີ່ໃຊ້ນ້ຳເມົາຫົດ.

ໂດຍຕົ້ນນ້ຳ ຫລື ລອຍນ້ຳໃນນ້ຳທີ່ມີເຊື້ອໂຣກປົນຢູ່ນຳ ຈາກແມງວັນທີ່ຕອນອາຈົມທີ່ມີເຊື້ອໂຣກແລ້ວມາຕອນອາຫານ

### ອາການບາງຢ່າງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນມີຫຍັງແດ່?

ຕາມທຳມະດາແລ້ວອາການຈະປະກົດຂຶ້ນພາຍໃນ 1-3 ມື້ຫລັງ ຈາກທີ່ໄດ້ຕິດແທດ.

ອາການຫົວໄປອາດຈະຮວມຖືງ:

- ລົງທ້ອງ (ອາດຈະມີເລືອດ ແລະ ນ້ຳເມືອກ)
- ຄີງຮ້ອນ
- ໝາວເຢືອກ
- ປວດທ້ອງ
- ປຸ້ນຫອ້ງປວດຮາກ / ຮາກ

ຈຳນວນຄົນສ່ວນນ້ອຍທີ່ຕິດພະຍາດ ຊິງແກໂລສິສ ຈະມີຄວາມເຈັບປວດ ຢູ່ອັດຕະໂນ, ຄັນຕາ, ແລະ ຕອນຢ່ຽວຈະເຈັບ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ “ຮີດເທີສ ສິນໂດຣມ”. ຄວາມເຈັບປວດນີ້ອາດຈະນານເຖິງຫລາຍເດືອນ ຫາ ຫລາຍປີ, ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດອັອກເສນທີ່ບໍ່ເຊົາງາຍໄດ້.

### ຈະກວດພົບ ຊິງແກໂລສິສ ໄດ້ແນວໃດ?

ຈະກວດພົບ ຊິງແກໂລສິສ ໄດ້ໂດຍທາງກວດອາຈົມ. ຫລັງຈາກ ນັ້ນຈະກວດອາຈົມອີກຫລາຍຄັ້ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນໄອ້ບໍ່ມີເຊື້ອ ໂຣກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ.

### ຈະຮັກສາ ຊິງແກໂລສິສ ໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ຊິງແກໂລສິສ ຈະຮັກສາດ້ວຍຢາອ້າເຊື້ອໂຣກ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນໝັກອາດຈະຕິເປັນປົກກະຕິໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນຢາ. ຄວມຈະຫລີກລ້ຽງຢາແກ້ລົງທ້ອງດັ່ງເຊັ່ນ “ອີໂມດຽມ” (Imodium) ຫລື “ໂລໂມທີລ” (Lomotil) ເພາະວ່າຢາແບບນີ້ຈະ ເຮັດໃຫ້ການເຈັບປ່ວຍໜັກຂຶ້ນ.

ດັ່ງໃນທຸກໆກໍລະນີຂອງການຮາກ ຫລື ລົງທ້ອງມັນສຳຄັນຫລາຍທີ່ ຈະບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳໂດຍຕ້ອງດື່ມນ້ຳຫລາຍໆ.

### ຈະປ້ອງກັນຈາກ ຊິງແກໂລສິສ ດ້ວຍວິທີໃດ?

- ຮັກສາຄວາມສະອາດຢ່າງດີ
- ລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູເລື້ອຍໆ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຫລັງຈາກໃຊ້ທ້ອງນ້ຳ, ປ່ຽນຜ້າອ້ອມ, ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະ ຕຽນອາຫານ ແລະ ດື່ມນ້ຳ
- ຖິ້ມຜ້າອ້ອມທີ່ເປື້ອນຢ່າງດີ, ແລະ ອ້າເຊື້ອໂຣກບ່ອນ ປ່ຽນຜ້າອ້ອມດ້ວຍ ນ້ຳຢາເຮັດໃຫ້ຂາວ, ໄລຊຸອ, ຫລື ເຈ້ຍເຊັດທີ່ອ້າແບັກແທເລັຍ
- ເບິ່ງເດັກເມື່ອເຂົາລ້າງມື
- ຫລີກລ້ຽງການດື່ມນ້ຳຈາກສະລອຍນ້ຳ
- ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອໂຣກ ຢ່າເຮັດອາຫານໃຫ້ຄົນອື່ນກິນ

ຄົນທີ່ມີເຊື້ອໂຣກບໍ່ຄວນຈະຖືກຈ້າງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອາຫານ ຫລື ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍຈົນວ່າມີການກວດອາຈົມສອງຄັ້ງ ແລະ ບໍ່ມີ ຊິງ ແກລາ ເຈື້ອປົນຢູ່ນຳ.

### ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຊິງແກໂລສິສ ໃຫ້ຕິດຕໍ່:

Ottawa County Health Department  
[www.miOttawa.org](http://www.miOttawa.org)  
Center for Disease Control and Prevention  
<http://www.bt.cdc.gov/>  
ໂທຣະສັບ: (888) 246-2675