



ຄວາມຈິງຕໍ່ມວນຊົນ

ໄຂ້ເຫລືອງ [YELLOW FEVER]

ໄຂ້ເຫລືອງຄືຫຍັງ?

ໄຂ້ເຫລືອງເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກວາຍຣັສ.

ພະຍາດໄຂ້ເຫລືອງແຜ່ລາມແນວໃດ?

ໂດຍການຖືກຍຸງກັດທີ່ມີເຊື້ອວາຍຣັສນີ້. ມີຍຸງຫລາຍໃນ ອາຟຣິກາກາງ ລະ ອາເມຣິກາໃຕ້.

ອາການບາງຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ອາການອາດຈະຮ່ວມດ້ວຍ:

- ຂັ້ນຕອນທີ່ໜຶ່ງ:
 - ປວດຫົວ, ເຈັບປວດກ້າມເນື້ອ, ເປັນໄຂ້, ບໍ່ຢາກເຂົ້າປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ຮາກ, ຕາ ແລະ ຜິວໜັງເປັນສີເຫລືອງ (ຈອນດິສ).
- ຂັ້ນຕອນທີສອງ:
 - ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະເຊົາຕິໃນຂັ້ນນີ້ແຕ່ຄົນອື່ນອາດຈະກາຍມີອາການຂັ້ນທີສາມ.
- ຂັ້ນຕອນທີສາມ:
 - ຕັບ ແລະ ໝາກໄຂຫລັງບໍ່ທ່າງານ
 - ເລືອດອອກເຜິ້ນແຂ້ວ
 - ຮາກອອກເປັນເລືອດ
 - ອາຈິມອອກເປັນເລືອດ (ຂີ້)
 - ເປັນບ້າໝູ
 - ນອນໝົດສະຕິ
 - ການຕາຍ

ຈະກວດພົບໄຂ້ເຫລືອງໄດ້ແນວໃດ?

ຕ້ອງກວດໃນຫ້ອງວິໄຈ ບອກທ່ານໝໍຂອງທ່ານຖ້າທາກທ່ານໄປບ່ອນທີ່ມີຄົນເປັນໄຂ້ເຫລືອງ.

ຈະຮັກສາໄຂ້ເຫລືອງໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ?

ບໍ່ມີການຮັກສາເຈາະຈົງສໍາລັບພະຍາດໄຂ້ເຫລືອງ.

ຈະປ້ອງກັນຈາກໄຂ້ເຫລືອງດ້ວຍວິທີໃດ?

- ມີຢາສັກສໍາລັບໄຂ້ເຫລືອງ. ຄວນຈະສັກຢາ 10 ຫາ 14 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະໄປບ່ອນທີ່ມີໄຂ້ເຫລືອງ.
- ໃຊ້ຢາໄລ່ຍຸງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
- ປົກຄຸມຜິວໜັງດ້ວຍເສື້ອຜ້າ.
- ໃຫ້ນອນກາງມຸ້ງ ຫລື ນອນໃນຫ້ອງແອເຢັນ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໄຂ້ເຫລືອງ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປທີ່:

Ottawa County Health Department
www.miOttawa.org
 Medline Plus/National Institutes of Health
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000680.htm